

食物環境衛生署

二零二六年觀塘區第二期滅蚊運動

目的

食物環境衛生署(食環署)將在觀塘區進行二零二六年的第二期滅蚊運動，本文件向委員闡述有關安排及詳情。

背景

2. 食環署已在二零二六年二月二十三日至三月二十日期間推行二零二六年的第一期滅蚊運動，有關本區進行的防治蚊患行動及結果詳情，請參閱附件I。

3. 二零二五年，香港共錄得七十一宗外地傳入和十一宗本地感染基孔肯雅熱個案、五十九宗外地傳入登革熱及一宗外地傳入日本腦炎個案。至於寨卡病毒感染方面，則沒有錄得個案。

4. 基孔肯雅熱是一種經蚊子傳播的傳染病，主要透過帶有基孔肯雅熱病毒的雌性伊蚊(本港常見的蚊品種為白紋伊蚊)叮咬而傳染給人類，並不會人傳人。當基孔肯雅熱患者被病媒蚊叮咬後，病媒蚊便可能受到感染，若再叮咬其他人，便有機會將病毒傳播。基孔肯雅熱潛伏期通常為三至八天。病人通常會出現發燒和關節痛。其他常見病徵包括肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和紅疹。大部分病人可以自行痊癒，但個別病人的關節痛會持續數月甚至數年。由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，並多數與其他已存在的健康問題有關，死亡

率低於千分之一。

5. 登革熱是由蚊子傳播的疾病，世界各地的公共衛生界別，尤其是熱帶和亞熱帶地區，均重視預防及遏止其傳播。登革熱病毒共有4種不同血清型。感染登革熱病毒的臨床表徵和所引致的後果眾多。登革熱患者的病況一般輕微，而且通常可以自行痊癒。不過，若患者之後感染其他血清型的登革熱病毒，則有較大可能患上可致命的重症登革熱。在人口密集的地方，若有可傳染登革熱的埃及伊蚊和白紋伊蚊滋生，登革熱便有可能迅速傳播。登革熱不會直接人傳人，而是透過帶有登革熱病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類。登革熱患者在發燒期間，可以把病毒傳染給蚊子。當登革熱患者被病媒蚊叮咬，便會把病毒傳給病媒蚊；病媒蚊若再叮咬其他人，便可能將病毒傳播開去。此外，政府亦曾接獲有人因輸血而受到感染的報告。

6. 日本腦炎經蚊傳播，如被帶病毒的蚊叮就有機會染病，主要病媒是三帶喙庫蚊。日本腦炎主要流行於亞洲及西太平洋的郊外及農村地區。蚊於稻田等大量積水地方繁殖，叮咬帶病毒的豬或野生雀鳥後就會受感染，再於叮咬人類或動物時將病毒傳播。食環署及相關政府部門已加強相關防蚊及滅蚊工作，包括聯同漁農自然護理署人員巡視附近豬場，並向豬農提供防蚊及滅蚊的技術協助，減少市民感染日本腦炎的機會。

7. 寨卡病毒主要透過受到感染的伊蚊叮咬而傳染給人類。儘管香港現時沒有發現被視為寨卡病毒傳播至人類的最主要病媒的埃及伊蚊，但本地常見的白紋伊蚊亦被視為可能的病媒。國際旅遊頻繁，寨卡病毒傳入香港的風險一直存在。寨卡病毒可透過外地感染者進入本港，被蚊叮咬而感染本地的白紋伊蚊，這些被感染的白紋伊蚊在香港會造成第二度傳播。因此，市民須提高對蚊傳疾病潛在危險的警覺性，社區和各政府部門也須齊心合力，積極參與防治蚊患工作。此外，寨卡

病毒亦可能透過血液或性接觸傳播。

8. 為保障市民健康及取得持續的防治蚊患成效，食環署將於四月十三日至六月十二日一連九星期舉行二零二六年第二期滅蚊運動，以繼續加強防治蚊患工作。

9. 二零二六年第二期滅蚊運動的宣傳口號是「齊來把蚊滅 預防日本腦炎、基孔肯雅熱及登革熱」，其目標如下：

- (a) 提高市民對登革熱、基孔肯雅熱、日本腦炎、寨卡病毒感染及其他蚊傳疾病的潛在危險的警覺性；
- (b) 鼓勵社區及各政府部門齊心合力，積極參與防治蚊患工作；
以及
- (c) 消除區內潛在蚊子滋生地點。

第二期滅蚊運動

10. 將於二零二六年四月十三日至六月十二日進行的第二期滅蚊運動，針對目標主要包括區內民居、學校、建築地盤、公共屋邨、醫院、非法耕種場地、海傍各公眾和私人貨物裝卸區、陸路邊境管制站、避風塘及出入境碼頭等的周邊範圍。

11. 食環署參考一籃子因素，當中包括白紋伊蚊誘蚊器監察結果、蚊患投訴、居民意見、建築地盤 / 工地及地區設施的分佈等資料數據，在區內劃定目標地點（[附件II](#)）進行全方位防治蚊患工作。運動期間，食環署防治蟲鼠隊人員會在目標地點和鄰近公眾地方的蚊子滋生地及潛在滋生地點，進行清除積水及防治蚊患行動，並藉此機會向市民提供防治蚊患的知識和技術建議。

宣傳教育

12. 在宣傳教育方面，除發放新聞稿、播放電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，及在主要公共交通設施張貼宣傳海報外，我們還會：

- (a) 印製防治蚊患的宣傳海報、單張、橫額及公共教育物品，供市民閱覽；
- (b) 透過有關政府部門及地區組織的參與和緊密聯繫，把宣傳資料廣泛地派發給市民，從而提高他們對防治蚊患的警覺性；
- (c) 向市民派發宣傳品；
- (d) 在大型屋邨商場舉行巡迴展覽，並派員為學校及屋邨的管理人員舉辦講座；
- (e) 針對目標地點的不同持份者宣傳防治蚊患訊息，並舉辦衛生講座，向他們提供防治蚊患的知識及技術指導；
- (f) 在食環署的衛生教育展覽及資料中心設專題展覽，並在本署網頁內加入關於滅蚊運動的資料；以及
- (g) 透過「食物環境衛生署」及「清潔龍阿德」的Facebook和Instagram專頁向市民加強宣傳防治蚊患的信息。

13. 為確保是次滅蚊運動得以順利進行，食環署防治蟲鼠事務諮詢組會就防治蚊患行動及相關宣傳教育活動提供技術支援。

地區參與

14. 為取得本區議會對這項運動的積極參與和支持，我們誠邀各議員

及委員參與各項相關活動及組織宣傳工作，並就食環署防治蚊患工作提供意見。本區環境衛生總監會與區議會秘書處安排有關細節。

食物環境衛生署

觀塘區環境衛生辦事處

二零二六年四月

食物環境衛生署
二零二六年觀塘區第一期滅蚊運動

二零二六年第一期滅蚊運動已於二零二六年二月二十三日至三月二十日進行。運動期間，有關防治蚊患工作均進行順利。以下是食物環境衛生署在本區進行滅蚊運動的行動及結果：

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. 巡察本區目標地點次數 | : 3 142 |
| 2. 發現並已處理蚊子滋生的地點數目 | : 56 |
| 3. 發現並已處理潛在蚊子滋生的地點數目 | : 2 269 |
| 4. 清理廢物數量(公噸) | : 8 |
| 5. 向違例人士提出檢控數目 | : 0 |
| 6. 發出警告信數目 | : 0 |
| 7. 向市民提供有關防治蚊患忠告及信息次數 | : 105 |
| 8. 派發有關宣傳單張／海報數目 | : 1 250 / 350 |
| 9. 轉介其他政府部門跟進的個案數目 | : 2 |

二零二六年觀塘區第二期滅蚊運動

目標地點

目標地點
牛頭角道、彩榮路、彩石里及順安道附近一帶
安德道、振華道、康寧道及安善道附近一帶
有康街、茜發道、晒草灣遊樂場及油塘道附近一帶
定安街、海濱道、創業街及鴻圖道附近一帶
啓田道、碧雲道、鯉魚門道及高超道附近一帶
康寧道、康寧道遊樂場、月華街及翠屏道附近一帶
曉明街、秀明道、協和街及基督教聯合醫院附近一帶
觀塘道、常悅道、臨華街及九龍灣運動場附近一帶